

FRONTLINE® Spot-On

Composition qualitative et quantitative :

FRONTLINE Spot-On **Chat** Fipronil 50 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.10 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.05 mg. Ethanol 0.05 ml. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien S** Fipronil 67 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.134 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.067 mg. Ethanol 0.067 ml. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien M** Fipronil 134 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.268 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.134 mg. Ethanol 0.134 ml. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien L** Fipronil 268 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.27 mg. Ethanol 0.268 ml. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien XL** Fipronil 402 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.40 mg. Ethanol 0.402 ml. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml.

Forme pharmaceutique : Solution pour spot-on.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles :

Affections à parasites sensibles au fipronil.

Chez les chats - Traitement curatif et préventif des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*) et par les tiques, élimination des poux broyeur. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de quatre semaines pour les puces et de deux semaines pour les tiques.

Chez les chiens - Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et les tiques, élimination des poux broyeur. La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les puces et d'un mois pour les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la *Dermatite Allergique par Piqûres de Puces* (DAPP).

Posologie :

En application sur la peau.

Chats : une pipette de FRONTLINE Spot-On Chat par animal (0.5 ml).

Chiens de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On S par animal (0.67 ml).

Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On M par animal (1.34 ml).

Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On L par animal (2.68 ml).

Chiens de 40 à 60 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On XL par animal (4.02 ml).

Pour les chiens de plus de 60 kg, appliquer une pipette de 4.02 ml ainsi qu'une pipette du volume inférieur approprié. En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines.

Contre-indications :

Chez les chats - En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc...) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Chez les chiens - En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc...) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. Ce produit a été spécialement développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux. Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon. En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Effets indésirables (fréquence et gravité) :

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés : *Chez les chats* Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été observés après utilisation. *Chez les chiens* Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser.

Temps d'attente : Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : Merial - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations :

FRONTLINE Spot-On **Chat** FR/V/8481982 4/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0.5 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien S** FR/V/1786870 3/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 4 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 0.67 ml. Carte de 12 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien M** FR/V/8858273 3/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 4 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 1.34 ml. Carte de 12 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien L** FR/V/6442706 9/1996. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 2 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 4 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 8 pipettes à embout sécable de 2.68 ml. Carte de 12 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.

FRONTLINE Spot-On **Chien XL** FR/V/4589892 9/2001. Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 4.02 ml. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.

Date A.M.M. :

FRONTLINE Spot-On Chat: 16/02/96, FRONTLINE Spot-On Chien S, FRONTLINE Spot-On Chien M et FRONTLINE Spot-On L: 12/11/96 et FRONTLINE Spot-On XL : 20/06/01. *Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.*

Classement du médicament en matière de délivrance : Usage vétérinaire.